

Aristolochiaceae



Son herbáceas perennes, rizomatosas o trepadoras leñosas. Hojas simples, pecioladas, alternas, dísticas, sin estípulas, palmatinervias. Flores solitarias, axilares, hermafroditas, zigomorfas. Fruto cápsula, dehiscente, con numerosas semillas.

- *Aristolochia pistolochia* L.
- *Aristolochia paucinervis* Pomel

Aristolochiaceae



Nombre Científico *Aristolochia pistolochia* L.

Nombre Común Candilito, Aristoloquia menor

Ecología Herbácea perenne rizomatosa con tubérculos cilíndricos fasciculados. Tallos de 10 a 30 cm. Hojas pecioladas de ovado-triangular a reniformes, con margen denticulado. Perianto pardo-purpúreo pubescente, con forma de “candil”. Fruto tipo cápsula. Florece de abril a mayo. Es poco frecuente. Aparece sobre sustratos arenosos y calcáreos.

Usos Se han descrito sus usos terapéuticos y se cita como emenagoga, purgante, para el tratamiento de epizootias y en cólicos biliares. Se usan tanto las raíces como las partes aéreas. Su uso medicinal tiene cierto riesgo debido al alcaloide *aristolochina*, que puede provocar alteraciones digestivas, renales, etc. Está prohibida su venta.

Aristolochiaceae



Nombre Científico *Aristolochia paucinervis* Pomel

Nombre Común Candilito, Aristoloquia macho, Aristoloquia larga.

Ecología Herbácea perenne, trepadora, rizomatosa. Tallos de 10 a 60 cm. Hojas pecioladas ovado-triangulares. Periantio de color amarillo-verdoso con bandas purpúreas en la garganta y base del limbo, con forma de "candil". Fruto tipo cápsula. Florece de febrero a julio. Habita en lugares abiertos y sobre todo tipo de sustratos.

Usos Tiene usos medicinales como purgante, abortiva, diurética y como antídoto ante picaduras de serpientes. Su uso medicinal tiene cierto riesgo debido al alcaloide *aristoloquina*.